



DOCTORA BEATRIZ LITERAT

Médica Ginecóloga. Especialista en Disfunciones Sexuales.

DE MUJER A MUJER

ACTUALIDAD EN GINECOLOGÍA



EMBARAZO EXTRAUTERINO

TAMBIÉN LLAMADO "EMBARAZO ECTÓPICO" POR IMPLANTARSE EL HUEVO FUERA DE SU LOCACIÓN HABITUAL. IMPLICA UNA SERIE DE COMPLICACIONES GINECOOBSTÉTRICAS PARA LA MUJER.

P ¿EXISTEN CAUSAS QUE FAVOREZCAN LOS EMBARAZOS EXTRAUTERINOS?

R Por ejemplo, la existencia, en las trompas, de algún tipo de malformación o alteración de su dinámica como consecuencia de procesos infecciosos o inflamatorios crónicos. También, cuando la arquitectura normal queda alterada luego de cirugías pélvicas. Cuando la luz está obstruida, por ejemplo, puede frenarse la trayectoria del huevo hacia el útero y éste quedar en la trompa.

P ¿EN QUÉ OTRO LUGAR PODRÍA IMPLANTARSE EL HUEVO?

R En el ovario, en el tejido pélvico llamado "peritoneo", en el cuello del útero y, más raramente, en cualquier otro lugar de la cavidad abdominal como el intestino, por ejemplo.

P ¿PUEDE LLEGAR A TÉRMINO UN EMBARAZO IMPLANTADO FUERA DEL ÚTERO?

Difícilmente, consideremos que el embrión requiere del endometrio que es su hábitat natural, que le aporta nutrientes, un espacio adecuado con temperatura y otras condiciones determinadas y con la protección de la cavidad uterina y sus estructuras musculares, que actúan como un nido, un refugio de seguridad frente a cualquier situación agresiva.

P ¿QUÉ PASA SI NO SE DETECTA EL EMBARAZO ECTÓPICO?

R Si se produjera la interrupción en forma natural y temprana, se reabsorbería y la mujer pensaría que se trata de un atraso menstrual; pero en general se detecta, ya sea porque se complica o porque los síntomas de embarazo y los signos típicos ginecológicos del embarazo extrauterino permiten su diagnóstico y tratamiento.

P ¿QUÉ SIGNIFICA LA COMPLICACIÓN?

R Que, al no poder progresar más el embara-

zo, se lesionan las estructuras en donde anida el huevo; como las trompas, por ejemplo, que pueden llegar a romperse y, entonces, aparecen los síntomas que llamamos del "ectópico complicado". Si no se trata a tiempo a la mujer, puede ser peligroso para su vida, por la hemorragia intra-abdominal que se produce. Este signo es engañoso para la mujer, que asocia el aborto con una hemorragia externa, vaginal, mientras que la pérdida sanguínea se está produciendo "dentro de su abdomen".

P ¿CÓMO PUEDE DIAGNOSTICARSE ANTES DE LA COMPLICACIÓN?

R El/la ginecólogo/a tiene que evaluar a la paciente y sus síntomas, descartar otros posibles cuadros clínicos con sintomatología parecida y realizar estudios de laboratorio, ecografía, laparoscopia, etcétera.

P ¿QUÉ TRATAMIENTOS EXISTEN?

R Hoy en día, se trata de conservar, en lo posible, las trompas para no comprometer la fertilidad futura; existen tratamientos conservadores clínicos, cuando se puede y, otras veces, es necesario realizar cirugía.

P ¿SON FRECUENTES LOS EMBARAZOS EXTRAUTERINOS?

R Constituyen menos del 0,5% de los embarazos totales.

Signos y síntomas de alerta para las mujeres

El haber padecido o padecer procesos pelvianos inflamatorios o infecciosos a repetición debe tenerse en cuenta para realizar consultas que permitan el diagnóstico temprano.

EMBARAZO ECTÓPICO NO COMPLICADO

- Atraso menstrual y síntomas habituales de embarazo o exámenes de laboratorio positivo para embarazo con un examen ginecológico negativo.

- Signos ecográficos positivos o laparoscopia positiva para este cuadro.

EMBARAZO ECTÓPICO COMPLICADO (grave y de extrema urgencia para la paciente)

- Dolor abdominal intenso y dolor en el hombro correspondiente a la trompa comprometida.

- Decaimiento y anemia aguda por pérdida sanguínea intraperitoneal.

- Hemorragia vaginal escasa, como "borra de café".